

ACTUALITES COVID-19

1. Vaccination Covid – Quels vaccins ?

Deux vaccins bivalents (Moderna BA.1 ou Pfizer BA.5) adaptés **ne sont autorisés que pour des rappels** (ces vaccins pourront être utilisés préférentiellement aux vaccins monovalents durant la campagne de rappel de vaccination prévue à l'automne, quel(s) que soi(en)t le(s) vaccin(s) administré(s) précédemment ⁽¹⁾⁽²⁾).

Disponibles à la commande via le portail Fluid-E.

1. *Spikevax Original/Omicron BA.1 (Moderna bivalent adapté)* ⁽³⁾ :

- Flacon de 5 doses, fermé par une capsule bleue prêt à l'emploi
- **Pour les personnes de 30 ans et plus**, quel que soit le vaccin injecté précédemment

2. *Comirnaty Original/Omicron BA.5 (Pfizer-BioNTech bivalent adapté)* ⁽⁴⁾ :

- Flacon de 6 doses, fermé par une capsule grise, prêt à l'emploi
- **Uniquement** ce vaccin pour les moins de 30 ans (12-29 ans)

Pour les plus de 30 ans, utilisation indifférenciée des vaccins BA.1 ou BA.5.

VACCINS COMPARAISONS DES DIFFERENTS FORMATS DISPONIBLES

	Pfizer 12+ Classique	Pfizer 12+ Adapté	Moderna Classique		Moderna Adapté
Prêt à l'emploi	Oui	Oui	Oui		Oui
Usage	12+ primo et rappels	12+ rappels	30 + primo et rappels		30+ rappels
Nombre de doses par flacon	6	6	10	20	5
Quantité d'ARNm par dose	30µg	30µg	100µg	50µg	50µg
Volume prélevé	0,3mL	0,3mL	0,5mL	0,25mL	0,5mL
Congélation flacon fermé	-80°C 12 mois	-80°C 12 mois	-20°C 9 mois		-20°C 9 mois
Conservation flacon ouvert (2- 30°C)	12 heures	12 heures	19 heures		19 heures
Conservation flacon fermé à 2- 8°C	10 semaines	10 semaines	1 mois		1 mois

2. Vaccination Covid – Pour qui ?

Population éligible au rappel automnal (2^{ème} rappel ou 4^{ème} dose) :

Attention, à ce jour aucun 3^{ème} rappel (ou 5^{ème} dose) ne fait partie des recommandations.

- Personnels soignants
- Population cible :
 - o Résidents d'EHPAD et USLD quel que soit leur âge ;
 - o Les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge ;
 - o Les personnes souffrant d'une ou plusieurs comorbidités ;
 - o Les femmes enceintes, dès le premier trimestre de grossesse ;
 - o Les personnes vivants dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, dont les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social.

ANNEXE – Quel vaccins pour quel public cet automne ⁽⁵⁾

3. Vaccination Covid – Quand ?

- **Dès 3 mois** après la dernière injection ou infection pour :
 - o les personnes âgées de 80 ans et plus
 - o les résidents en EHPAD et en USLD
 - o les personnes sévèrement immunodéprimées, quel que soit leur âge ;
- **Dès 6 mois** après la dernière injection pour toutes les autres personnes éligibles. **En cas d'infection récente au SARS-Cov2, le rappel est recommandé dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection ⁽⁶⁾.**

4. Vaccination Covid/Grippe :

- **A compter du 18 octobre**, la co-vaccination contre le Covid-19 et contre la grippe doit être encouragée. Les deux injections peuvent être pratiquées le même jour, sur deux sites d'injection distincts. La vaccination grippe saisonnière réservée aux seules personnes ciblées par les recommandations durant 4 semaines.

Si les deux vaccins ne sont pas administrés au même moment, il n'y a pas de délai à respecter entre les deux vaccinations ⁽²⁾.

5. Vaccination Covid – Evolution du dispositif des contre-indications :

Levée de la contre-indication de la primo-vaccination contre le Covid-19 en cas d'antécédent de syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique post- infection par le Covid-19⁽⁷⁾.

ANNEXE



QUELS VACCINS POUR QUEL PUBLIC CET AUTOMNE ?

Ma situation	Mon âge	Pfizer bivalent	Moderna bivalent	Quand ?
	60 à 79 ans	✓	✓	Dès 6 mois après ma dernière injection*
	80 ans et plus	✓	✓	Dès 3 mois après ma dernière injection ou infection
Je suis résident en EHPAD ou en USLD		✓	✓	Dès 3 mois après ma dernière injection ou infection
Je suis immunodéprimé	12 à 29 ans	✓		Dès 3 mois après ma dernière injection ou infection
	30 ans et plus	✓	✓	
Je suis à risque de forme grave de Covid-19	12 à 29 ans	✓		Dès 6 mois après ma dernière injection*
	30 à 59 ans	✓	✓	
Je suis enceinte (dès le 1 ^{er} trimestre de grossesse)	Moins de 30 ans	✓		Dès 6 mois après ma dernière injection*
	30 ans et plus	✓	✓	
Je suis en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables	12 à 29 ans	✓		Dès 6 mois après ma dernière injection*
	30 ans et plus	✓	✓	

* En cas d'infection récente au Covid-19, la vaccination est recommandée dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection.

Si je débute la vaccination

Mon âge	Ma situation	Pfizer-BioNTech	Moderna	Novavax
5 à 11 ans		✓ forme pédiatrique		
12 à 29 ans		✓		
30 ans et plus		✓	✓	
18 ans et plus	J'ai une contre-indication ou je souhaite une alternative aux vaccins à ARN-m			✓

06/10/2022

N.B. :

- Pour les rappels, les autorités scientifiques recommandent préférentiellement l'utilisation de vaccins à ARN messenger bivalents.
- Les vaccins bivalents peuvent uniquement être injectés en tant que rappel vaccinal. Pour recevoir cette nouvelle dose dès l'automne, il faut donc être déjà vacciné.
- La vaccination est possible auprès de nombreux professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers...), mais aussi en centres de vaccination, ou à domicile. Pour trouver le lieu de vaccination le plus proche, rendez-vous sur www.sante.fr

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur : www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

Pour plus d'informations : Section Santé Publique
Tel : 01 53 89 33 19 / 01 53 89 32 08
sante-publique.cn@ordre.medecin.fr

LIENS UTILES

- (1) HAS – Recommandations Stratégie vaccinale de rappel contre le Covid-19 : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/recommandation_strategie_vaccinale_de_rappel_contre_le_covid-19_2022-09-20_13-59-33_801.pdf
- (2) DGS-Urgent n°2022_79 « Lancement de la campagne automnale de vaccination contre la Covid-19 » : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-79_lancement_de_la_campagne_automnale_de_vaccination_contre_le_covid-19_-_v1.pdf
- (3) HAS – Rapport d'évaluation – Place du vaccin SPIKEVAX bivalent BA.1 (19/09/2022) : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/rapport_evaluation_place_du_vaccin_spikevax_bivalent_original.omicron_ba.1_2022-09-20_13-47-47_119.pdf
- (4) HAS – Rapport d'évaluation – Place du vaccin COMIRNATY bivalents BA.4-5 (19/09/2022) : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/rapport_evaluation_place_des_vaccins_cominarty_bivalents_original.omicron_ba.1_et_origional_omicron_ba.4-5.pdf
- (5) Ministère de la santé – Quel vaccins pour quel public cet automne : <https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/dose-de-rappel-covid19>
- (6) Ministère de la santé – La campagne de vaccination automnale contre le Covid-19 : <https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-campagne-de-vaccination-automnale-contre-le-covid-19>
- (7) Formulaire CERFA – Contre-indications : https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/S3188-certificat-medical-contre-indication-covid19_0.pdf

Si les liens ne fonctionnent pas, rendez-vous sur le site internet du CNOM : [ici](https://www.conseil-national.medecin.fr)

<https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130>

Pour plus d'informations : Section Santé Publique
Tel : 01 53 89 33 19 / 01 53 89 32 08
sante-publique.cn@ordre.medecin.fr